

CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN

El Estado Nacional garantiza **VACUNAS GRATUITAS** en centros de salud y hospitales públicos de todo el país

Vacunas	BCG (1)	Hepatitis B HB (2)	Neumococo Conjugada (3)	Quíntuple Pentavalente DTP-HB-Hib (4)	Rotavirus (5)	Cuádruple o Quíntuple Pentavalente (6)	Polio (7)	Triple Viral SRP (8)	Gripe (9)	Hepatitis A HA (10)	Varicela (11)	Triple Bacteriana Celular DTP (12)	Triple Bacteriana Acelular dTpa (13)	Doble Bacteriana dT (14)	Virus Papiloma Humano VPH (15)	Doble Viral SR (16)	Fiebre Amarilla FA (17)	Fiebre Hemorrágica Argentina FHA (18)
Edad	única dosis (A)	dosis neonatal (B)																
Recién nacido																		
2 meses			1º dosis	1º dosis	1º dosis (D)		1º dosis											
4 meses			2º dosis	2º dosis	2º dosis (E)		2º dosis											
6 meses				3º dosis			3º dosis											
12 meses			refuerzo					1º dosis			única dosis							
15 meses																		
15-18 meses						1º refuerzo	4º dosis				única dosis							
18 meses																	1º dosis (M)	
24 meses																		
5-6 años (ingreso escolar)							refuerzo	2º dosis				2º refuerzo						
11 años		iniciar o completar esquema (C)						iniciar o completar esquema (F)					refuerzo		sólo para niñas		refuerzo (N)	
A partir de los 15 años																		única dosis (Ñ)
Adultos		iniciar o completar esquema (C)												refuerzo (K)		iniciar o completar esquema (F)		
Embarazadas								dosis anual (H)					refuerzo (L)					
Puerperio								dosis anual (I)								iniciar o completar esquema (F)		
Personal de salud		iniciar o completar esquema (C)						dosis anual					única dosis (J)			iniciar o completar esquema (F)		

(A) Antes de egresar de la maternidad.

(B) En los primeras 12 horas de vida.

(C) Si no hubiera recibido el esquema completo deberá completarlo. En caso de tener que iniciarlo: aplicar 1º dosis, 2º dosis al mes de la primera y 3º dosis a los 6 meses de la primera.

(D) La primera dosis debe administrarse antes de las 14 semanas y 6 días o tres meses y medio.

(E) La última dosis debe administrarse antes de las 24 semanas o los 6 meses de vida.

(F) Si no hubiera recibido dos dosis de Triple Viral a una de Triple Viral más una dosis de Doble Viral.

(G) Deberán recibir en la primovacunación 2 dosis de vacuna

separadas al menos por cuatro semanas.

(H) En cualquier trimestre de la gestación.

(I) Puérperas hasta el egreso de la maternidad, que no se vacunaron durante el embarazo.

(J) Personal de salud que atiende niños menores a 1 año.

(K) A los 10 años de la última vacunación antitetánica.

(L) A partir de la semana 20 de gestación.

(M) Residentes en zonas de riesgo.

(N) Residentes en zonas de riesgo. Único refuerzo a los 10 años de la 1º dosis.

(Ñ) Residentes o trabajadores con riesgo ocupacional en zonas de riesgo.

(1) BCG: Tuberculosis (formas invasivas)

(2) HB: Hepatitis B

(3) Previene la Meningitis, Neumonía y Sepsis por Neumococo.

(4) DTP-HB-Hib: (Quíntuple/Pentavalente) Difteria, Tétanos, Tos Convulsa, Hep B, Haemophilus Influenzae b.

(5) ROTAVIRUS

(6) Cuádruple DTaP-Hib: Difteria, Tétanos, Tos Convulsa, Haemophilus

influenzae b. Quíntuple/Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos Convulsa,

Hep B, Haemophilus Influenzae b. Aplicar la que este disponible.

(7) Vacuna contra la Poliomielitis.

(8) SRP: (Triple viral) Sarampión, Rubeola, Paperas.

(9) GRIPE

(10) HA: Hepatitis A

(11) Varicela.

(12) DTP: (Triple Bacteriana Acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsa.

(13) dTpa: (Triple Bacteriana Acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsa.

(14) dT (Doble Bacteriana) Difteria, Tétanos.

(15) VPH: Virus Papiloma Humano, causante del 100% de los casos de

cáncer de cuello de útero.

(16) SR: (Doble Viral) Sarampión, Rubeola.

(17) FA: (Fiebre Amarilla)

(18) FHA: (Fiebre hemorrágica argentina)

Para más información:

0-800-222-1002 www.msal.gov.ar



Ministerio de Salud

